

Plan vakcinacije protiv Humanog papiloma virusa (HPV) za učenice osmog razreda: Šta bi trebalo da znate

Šta je humani papiloma virus (HPV)?

HPV je običan virus koji ima preko 100 različitih vrsta. Neki tipovi HPV-a mogu da izazovu rak grlića materice kod žena. Većina HPV infekcija se može sprečiti vakcinom.

Kako se HPV prenosi?

HPV se najčešće prenosi seksualnim odnosima kontaktom kože na kožu sa zaraženom osobom.

Koji su simptomi HPV-a?

Većina ljudi ne oseća nikakve simptome tako da ljudi mogu i da ne znaju da su zaraženi HPV-om ali i pored toga oni nose u sebi virus i mogu da zaraze druge ljude. U zavisnosti od tipa HPV infekcije, kod zaražene osobe mogu da se razviju abnormalnosti na grliću materice, rak grlića materice, druge vrste raka na genitalijama, ili genitalne bradavice.

Šta može da se dogodi kad dobijete HPV?

Većina odraslih u Kanadi će biti zaražena HPV-om u nekom trenutku u životu. Imuni sistem u organizmu se obično sam oslobodi ovog virusa. Kod nekih ljudi, virus može da dovede do raka na grliću materice. Svake godine u Ontariju 500 žena je dijagnostirano sa rakom grlića materice a 140 umre.

Kako mogu ja da pomognem u zaštiti mog deteta od HPV?

Vakcinišite svoje dete. Vakcina može da spreči infekciju koju izazivaju četiri tipa HPV-a – tipovi 6, 11, 16 i 18. U Kanadi, tipovi 16 i 18 uzrokuju 70% raka grlića materice. Tipovi 6 i 11 uzrokuju oko 90% genitalnih bradavica.

Kako se daje vakcina protiv HPV?

Vakcina se daje iglom u ruku. Tri doze HPV vakcine su neophodne za zaštitu. Te tri doze vakcine se daju u toku jedne školske godine. Uobičajeno, druga doza se daje 2 meseca nakon prve vakcine a treća doza 6 meseci posle prve doze.

Ko treba da primi HPV vakcinu?

HPV vakcina je odobrena za ženske osobe stare 9 do 26 godina. Vakcina je najefektivnija ako se primi pre nego što počne seksualna aktivnost. Provincijska vlada finansira HPV vakcinu tako da je ona besplatna za sve devojke u osmom razredu ako ih prime u školskim klinikama.

Ko ne treba da primi HPV vakcinu?

Vaše dete ne treba da primi HPV vakcinu ako je ona:

- već primila punu dozu HPV vakcine;
- imala ozbiljnu reakciju na prethodnu dozu HPV vakcine;
- ima gljivičnu alergiju ili alergiju na neki sastojak u vakcini; i
- ako je trudna.

Ne preporučuje se da devojka primi vakcinu ako ima temperaturu ili neko oboljenje ozbiljnije od lake prehlade.



Ontario

Da li postoje prateće pojave uzrokovane ovom vakcinom?

HPV vakcina je bezbedna i odobrena za upotrebu u Kanadi za ženske osobe stare 9 do 26 godina. HPV vakcina ima prateće pojave slične drugim postojećim vakcinama. Ove prateće pojave uključuju crvenilo, osetljivost i otok na mestu dobijanja vakcine i, redje, povišenu temperaturu, mučninu, nesvesticu i glavobolju. Retke reakcije koje se javljaju u toku 15 dana od vakcinacije trebalo bi prijaviti Vašem lekaru ili Vašoj lokalnoj zdravstvenoj ustanovi. Ove reakcije uključuju probleme sa disanjem, oticanje lica ili usta, povišenu temperaturu od preko 39°C, koprivnjaču ili osip. Patronažne sestre daju ovu vakcinu i sve vreme su prisutne u školskim klinikama. One su obučene kako da postupe u slučajevima ozbiljnih reakcija na vakcinu.

Koliko je uspešna ova vakcina?

Ova vakcina je skoro 100% efektivna protiv četiri tipa HPV-a protiv kojih ona štiti. Istraživanja su pokazala da uspešna zaštita traje pet godina nakon vakcinacije. Ne postoji nikakav rizik od dobijanja HPV infekcije od same vakcine jer ova vakcina u sebi ne sadrži živi virus.

Druge važne informacije koje treba da znate o HPV vakcini.

Iako ova vakcina pruža visok nivo zaštite od HPV-a, ona nije zamena za pregled za rak grlića materice. Redovni pregledi grlića materice, u kombinaciji sa ovom vakcinom, pružaju najbolju zaštitu protiv raka grlića materice. Dodatna doza vakcine može biti potrebna kasnije u životu. Ova vakcina trenutno nije odobrena za muškarce.

Ako moje dete ne ide u osmi razred, da li i ona može da primi vakcinu?

Vlada Ontarija finansira HPV vakcine tako da su one besplatne za sve devojke u osmom razredu ako ih prime u školskim klinikama. Sve ostale ženske osobe stare 9 do 26 godina mogu da posete svog lekara i da plate dobijanje vakcine. Tri doze koštaju ukupno oko \$400.

Pre nego što daju HPV vakcinu, patronažne sestre će Vašem detetu postaviti pitanja u vezi:

- zdravstvenog stanja Vašeg deteta na dan vakcinacije;
- opšteg zdravstvenog stanja Vašeg deteta;
- postojećih alergija na vakcine ili lekove;
- lekova koje Vaše dete uzima;
- ranijih problema sa vakcinama; i
- prethodnih HPV vakcinacija.

Na dan kada Vam se dete vakciniše:

- dete treba da obuče majicu sa kratkim rukavima da bi vakcinacija bila lakša; i
- dete treba dobro da jede za doručak ili ručak pre dolaska na kliniku.

Ako je Vaše dete već primilo HPV vakcinu, molimo Vas da pozovete Vašu lokalnu zdravstvenu ustanovu da ažurirate karton Vašeg deteta ili da ispunite podatke na obrascu za davanje saglasnosti.

Hoćete da saznate više?

Za više informacija:

- Pozovite INFOLINE
1-866-559-4598 (TTY 1-800-387-5559)
- Posetite vebstranicu www.hpvontario.ca
- Obratite se svojoj lokalnoj zdravstvenoj ustanovi