

ما هو الجديد حول فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الاستشارة والتحليلات؟

المزيد من مواقع التحليل التي لا تكشف أسماء من يجري عليهم التحليل

صرحت حكومة أونتاريو مؤخراً لـ 24 موقع آخر لتقديم تحليل غير معروف أسماء من يجري عليهم ليصبح عددها الإجمالي 50 موقعاً وبذلك زادت تحليلات فيروس نقص المناعة البشرية التي لا تكشف عن هوية من يجري عليهم التحليل في أجزاء كثيرة من المقاطعة. ويمكن للأطباء الذين لا يجدون الوقت الكافي لإجراء تحاليل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أن يحيلوا العملاء إلى عيادة الصحة العامة والصحة الجنسية أو إلى أي برنامج تحليل لا يذكر اسم من يجري عليه ذلك التحليل.

قم بالاتصال على خط فقدان المناعة المكتسبة (AIDS Hotline) الساخن لمعرفة المواقع وأرقام الهاتف الخاصة بمواقع التحليل التي لا تذكر أسماء من يجري عليهم التحليل على رقم 416-392-2437 أو 800-668-800. الخط الفرنسي: 1-800-267-7432

أين توجد مواقع تحليل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أونتاريو التي لا تكشف هوية من يقوم بالتحليل؟

22 في وحدات الصحة العامة

16 في مراكز الصحة المجتمعية

4 في ممارسات الولادة (للاستخدام فقط بواسطة عملائهم)

3 في مراكز الصحة الجنسية

5 في مواقع أخرى - مستشفى، وكالة شباب، وكاليتين من وكالات النهوض بالسكان، وفريق رعاية الصحة الأسرية.

الأفراد الذين يجرون تحليلات لمعرفة الفيروسات النشطة في أي نقطة من نقاط الرعاية التي تقدم خدمة التحليل الخضع لتحليل تأكيد باستخدام التحليل المعمل المعيارى. وسوف يكون عليهم الانتظار لمدة تبلغ أسبوعين للحصول على نتائجهم. (ملاحظة: يختلف وقت الحصول على النتائج من مكان لآخر في المقاطعة). وبالإضافة إلى ذلك، يقوم العمل الصحى العام الآن بإجراء تحاليل تحري جزيئات الفيروس فى الدم بشكل روتينى (p24 antigen) على أي عينة كما يوضح نموذج الطلب أن الشخص فى فترة النافذة (مرحلة الأعراض والعلامات المتعلقة بالإيدز) أنه يعانى من الأعراض وأن مستوى تعرضه عالى.

المزيد من المعلومات حول المخاطر

نعرف الآن أن

- النساء الشابات (على سبيل المثال تحت عمر 18) يتعرضن لخطورة أكبر للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من النساء الكبار فى السن حيث أن خلايا عنق الرحم لا تنمو تماماً إلا بعد عمر 18.
- تتأثر صحة الغشاء المخامى بوجود أي أمراض جنسية معدية (STIs) أخرى، مستويات الهرمون الأنثوى، عدم وجود الترطيب المهبلى واستخدام المواد المهيجة.
- ويقوم الحمل الفيروسي المنخفض بتقليل مخاطرة نقل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ولكن لا يقضى عليها تماماً. ولا تصل الأدوية المضادة للفيروس دائماً إلى أعلى مستويات كبح الفيروس فى الجهاز التناسلى. وتزداد الخطورة لو كان الشخص يعانى من عدوى انتقال جنسية أخرى.
- وهناك خطورة لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عن طريق مشاركة معدات أدوية الأخرين (بجانب الإبر) مثل أوعية الطهي والمرشحات والماء و ماسح الكحول وضواغط وقف النزف و الأنابيب المكسورة و والأكواب الزجاجية .

فهم أعمق للمحددات الاجتماعية / المخاطر

تتأثر مقدرة الأفراد على ممارسة واستخدام الجنس والأدوية بشكل آمن بالمحددات الاجتماعية للصحة مثل الفقر والسكن وثقل علاقات التوازن واستخدام العقاقير أو الكحول وما يصاحب ذلك من عار. وتختلف الأمور التي يواجهها الأفراد حسب عمرهم واتجاههم الجنسى والثقافة والعرق.

المزيد من التحليلات التي تتسم بالمرونة

تقوم وزارة الصحة والرعاية طوية المدى بإنشاء نقاط رعاية مجانية يجرى فيها تحليلات فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) متاحة فى المواقع التي لا تذكر أسماء أصحاب التحليلات وفى عيادات الصحة العامة والصحة الجنسية ومراكز الصحة المجتمعية التي تختار تقديم هذا النوع من التحليل. ومن خلال نقطة الرعاية التي يجرى فيها التحليلات، سوء يعرف الأشخاص الذين نتيجتهم السلبية من خلال بضع دقائق فقط من التحليل. ويجب على

يقدم الخط الساخن للإيدز في يناير 2008 خدمته باللغات التالية:

اللغة الأرمنية

البنغالية

الكانتونيز

الإنجليزية

الفلبينية

الفرنسية

الهافا

الهندية

الماندرازية

البرتغالية

الروسية

السنهالية

الأسبانية

السواحيلية

التايوانية

التاميلية

الأوردو

الفيتنامية

ويجب على الوقاية الفعالة معالجة كل هذه الأمور . (ارجع إلى الملحق 2 للحصول على مناقشة مختصرة لمواضيع معينة للسكان).

أهمية إجراء تحليلات لبيان الأمراض الجنسية المعدية وفيروس سي الكبدي

تصبح نسبة كبيرة من الأفراد الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية عرضة أيضاً للإصابة بالأمراض الجنسية المعدية الأخرى وبفيروس سي الكبدي. وأي شخص يتقدم لإجراء تحليل فيروس نقص المناعة البشرية يجب أن ينصح بإجراء تحليل الأمراض الجنسية المعدية وفيروس سي الكبدي لتقدير المخاطر.

الوقت المطلوب لتحليل فيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن تجرى الاستشارة المسبقة لفيروس نقص المناعة البشرية خلال 15 - 20 دقيقة، ومع ذلك، سوف يختلف الوقت حسب مستوى إدراك العميل والحاجات الأخرى.

الاشتراطات القانونية للإفصاح إلى الشركاء المستقبلين

خلال السنوات القليلة الماضية، تم إدانة عدد من الأفراد الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية بتهم جنائية مثل التورط في أنشطة جنسية التي تشكل خطورة في نقل فيروس نقص المناعة البشرية بدون إخبار شركائهم بوضع الفيروس لديهم. ويجب أن ننصح الأفراد الذين يجدون تحليل فيروس نقص المناعة البشرية عندهم إيجابي أن يخبروا شركائهم بذلك قبل أن يشعروا في أي نشاط قد يشكل خطراً على شركائهم مثل الجنس الذي يتم بدون حماية المهبل أو الشرج وبدون ذلك لا تقبل موافقة الشريك على ممارسة الجنس ويجب محاكمة الشخص الذي يحمل الفيروس عندئذ.

ولا يزال القانون حتى الآن غير واضح فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى التي تشكل خطورة. وللحصول على المزيد من المعلومات حول اشتراطات الإفصاح عن وضع فيروس نقص المناعة البشرية للشركاء المستقبلين، قم بالاتصال على العيادة القانونية للإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario) (HALCO)

على الرقم : 1-888-705-8889 ؛ 416-340-7790

www.halco.org

المساعدة في مواضيع تتعلق باللغة

يقدم الخط الساخن للإيدز معلومات بـ 18 لغة ولديه فريق عمل يمكن أن يقدم خدمات ترجمة تحريرية وشفهية عندما لا يستطيع المستشارين تحدث نفس اللغة التي يتحدث بها العملاء. ولديهم دراية بمواضيع تحليل فيروس نقص المناعة البشرية وهم بمثابة مورد ممتاز. (أرقام الخط الساخن للإيدز : 416-392-2437 أو 1-800-668-2437 الخط الفرنسي:

1-800-267-7432

المساعدة في إخطار الشركاء

يعمل مكتب الإيدز في هذا المجال لتطوير إرشادات أكثر تفصيلاً لإخطار الشركاء مما سوف يساعد المستشارين أكثر في معالجة المواضيع الصعبة.

قوائم فحص وأدوات أخرى

أدرجت وزارة الصحة وإرشادات الرعاية طويلة المدى لاستشارة وتحليل الإيدز عدد من الأدوات مثل قائمة الفحص التي تسبق التحليل وإرشادات الجنس الآمن من خلال نظرة وخطوات ينصح بها ونصيحة عند تقديم نتيجة تحليل إيجابي. تعرف على المزيد من التحليل في

SayYesToKnowing.ca