

Шта је ново у саветовању и тестирању на ХИВ?

Више Локација за Анонимно Тестирање

Влада Онтарија је недавно ауторизовала још 24 локације за обављање анонимног тестирања, тако да их сада има укупно 50, а и повећала је доступност анонимног ХИВ тестирања у многим деловима ове провинције. Лекари који немају времена или искуства да обављају ХИВ тестове могу да упуте своје клијенте у јавну здравствену клинику за сексуално здравље или на програм анонимног тестирања.

За локације и бројеве телефона локација за анонимно тестирање, позовите АИДС линију на 416-392-2437 или 1-800-668-2437;

На француском језику: 1-800-267-7432.

Где се у Онтарију Налазе Локације за Анонимно ХИВ Тестирање?

22 у јавним здравственим установама.

16 у локалним здравственим центрима.

4 у праксама бабица (само за њихове клијенте).

3 у центрима за сексуално здравље.

5 при другим установама - једној болници, једној омладинској агенцији, у две аборицијске агенције, и при једном тиму здравствених радника.

Више Флексибилних Тестова

Министарство за здравље и дугорочну негу отвара могућност да бесплатне брзе ХИВ тестове обављају локације за анонимно тестирање, јавне здравствене клинике за сексуално здравље као и локални здравствени центри који одлуче да понуде ову врсту тестирања. Са брзим ХИВ тестирањем, особе које нису заражене ће то знати неколико минута након тестирања. Особе код којих се покаже реакција на брзи ХИВ тест, мораће да ураде потврдни тест који се обавља уз

помоћ стандардног тестирања у лабораторији, и мораће да чекају на резултате до две недеље. (Напомена: време чекања на резултате теста није исто у целој провинцији.) Осим тога, јавна здравствена лабораторија сада рутински обавља п24-антиген тест на свим узорцима тестирања када на налогу стоји да је особа у такозваном вперииоду прозораг, или да има симптоме И да је истовремено била изложена високом ризику.

Више Знања о Ризицима

Ми знамо да

- Код млађих жена (жена млађих од 18 година) ризик од добијања ХИВ-а је виши него код старијих жена јер се ћелије у грлићу материце не развију у потпуности до 18-те године.
- На здравље слузне мембране утиче присуство других полно преносивих инфекција (ППИ), ниво женских хормона, одсуство вагиналне лубрикације и употреба иритирајућих супстанци.
- Мала количина вируса у телу смањује али не елиминише ризик од преноса ХИВ-а. Антивирусни лекови не досегну увек ниво довољно висок да би могли да сузбију ХИВ у гениталном тракту. Ризик се увећава у случају да особа има неку другу полно преносиву инфекцију.
- Постоји ризик преноса ХИВ заједничком употребом прибора за коришћење дрога (не само игала) као што су посуде за кување (топљење), филтери, вода, алкохолни обрисак, подвези, луле за пушење и стаклене цевчице.

Боље Разумевање Социјалних Фактора/Ризика

На способност људи да практикују безбеднији секс и употребу дрога утичу социјални фактори здравља као што су сиромаштво, стамбени услови, неједнакост партнера у вези, коришћење дрога или алкохола, и стигма. Проблеми са којима се људи сусрећу често варирају у зависности од старости, сексуалне оријентације, културе и расе.

Ефективно превентивно саветовање се мора бавити свим тим проблемима. (Погледајте Додатак 2 за кратку дискусију о проблемима специфичним за популацију.)

Важност Тестирања на Друге ППИ-е и Хепатитис Ц

Значајан проценат особа које су изложене ХИВ ризику су такође у ризику да добију друге ППИ-е и хепатитис Ц. Све особе које дођу на ХИВ тестирање требало би посаветовати и проценити њихов ризик од добијања других ППИ-а и хепатитиса Ц, и понудити им тестирање.

Време Потребно за ХИВ Тестирање

ХИВ саветовање пре тестирања може да се обави у року од 15 до 20 минута; међутим, трајање ће зависити од нивоа знања и других потреба клијента.

Законска Обавеза да се Обавесте Будући Партнери

Током протеклих неколико година, велики број особа заражених ХИВ-ом је било осуђено под кривичном оптужбом да су ступале у сексуалне односе који представљају значајан ризик за преношење ХИВ вируса, а да при том нису обавестиле своје партнере о свом ХИВ статусу. Особе чији су резултати на ХИВ тестирању позитивни, сада се морају саветовати да својим партнерима кажу да имају ХИВ пре него што се упусте у било какву високоризичну активност, као на пример незаштита вагинални или анални полни однос Ђ у супротном, пристанак партнера на полни однос није пуноважан, а особа која има ХИВ би могла да буде кривично одговорна. Закон још увек није сасвим јасан што се тиче других високоризичних активности. За више информација у вези законске обавезе о информисању будућих партнера о ХИВ статусу, контактирајте Правни Центар за ХИВ и АИДС (Онтарио) (ХИВ & АИДС Легал Цлиниц Ђ ХАЛЦО): 416-340-7790; 1-888-705-8889; њњњ. халцо.орг.

Помоћ са Језичким Проблемима

Телефонска линија за АИДС пружа информације на 18 језика и има запослене који пружају услуге усменог и писменог превођења када саветници не говоре језик својих клијената. Они су добро упознати са питањима ХИВ тестирања и представљају изврстан ресурс. (Бројеви АИДС телефонске линије: 416-392-2437 или 1-800-668-2437; на француском језику: 1-800-267-7432.)

У јануару 2008. године, телефонска линија за АИДС пружала је услуге на следећим језицима:

армениском
бенгалском
кантонеском
енглеском
филипинском
француском
хака
хинди
мандаринском
португалском
руском
синхалском
шпанском
свахили
тајванском
тамилском
урду
вијетнамском

Помоћ у Обавештавању Партнера

Биро за АИДС (АИДС Буреау) ради са људима на терену како би се направила много детаљнија упутства за обавештавање партнера која би помогла саветницима да дискутују о тешким ситуацијама.

Остале Листе Провере и Помагала

Приручник за Саветовање и Тестирање на ХИВ које је издало Министарство за здравље и дугорочну негу садржи велики број помоћних материјала као што су листа провере за саветовање пре тестирања, кратка листа упутстава у вези безбеднијег секса, упутства за саветнике, и савети како да се саопште позитивни резултати на тесту за ХИВ.

Научите више о тестирању на страници **SayYesToKnowing.ca**