

# 아이들이 **독감** 예방접종을 맞아야 하는 이유

독감 바이러스는 아이들 사이에서 신속하게 퍼집니다. 학교에서나 가정에서나 주로 아이들이 바이러스를 퍼뜨립니다. 독감 바이러스를 가지고 있는 아이가 사용했거나 만진 장난감이나 식기 등과 접촉하면 독감에 걸릴 위험이 커집니다. 아동과 독감과 예방주사에 대한 아래의 사실들을 잘 읽어보십시오.

- 생후 6개월 이상의 아동은 예방접종을 맞을 수 있습니다. 생후 6개월 미만의 아동은 맞지 말아야 합니다.
- 독감 예방접종은 안전하며, 건강한 아동은 예방접종을 잘 견딥니다. 예방접종에는 미량의 티메로살(방부제)이 들어 있지만, 이 성분이 자폐증, 주의력 결여 장애, 또는 기타 신경 장애 등의 해를 일으킬 수 있다는 증거는 없습니다.
- 처음으로 예방접종을 맞는 9세 이하의 아동은 두 번 맞아야 합니다. 두 번째 접종은 첫 번째 접종을 맞고 나서 최소한 한 달 뒤에 맞아야 합니다. 지난해 독감철에 한 번 이상 접종을 맞은 아동은 두 번 맞지 않아도 됩니다.
- 성인보다 아동의 독감 감염율이 높습니다.
- 생후 6-23개월의 건강한 아동은 독감에 더 취약하며, 독감 증상으로 병원에 입원할 위험이 클 수 있습니다.
- 장기간 아스피린(아세틸살리실산) 치료를 받은 아동 및 청소년(생후 6개월에서 18세까지)은 독감에 걸린 뒤 레이 증후군이 발병할 위험이 클 수 있습니다.

그러나 예방접종이 심각한 해를 일으킬 위험성은 매우 낮습니다. 여러분의 자녀가 독감과 그 합병증에 걸릴 위험을 줄이도록, 올가을에는 되도록 예방접종을 맞으십시오.

어떤 예방접종이든지 그 이로움과 위험에 대해 항상 보건 전문가와 상담해야 합니다.

**무료 독감 예방접종. 슬기로운 대비.**

독감 예방접종을 맞는 방법에 대해서는 가정의, 간호사, 약사, 또는 고용주에게 문의하십시오. 1-866-FLU-'N YOU (1-866-358-6968) (TTY 1-800-387-5559)로 전화하면 집 가까이 있는 진료소를 안내해드립니다.

독감 및 예방접종에 대해 더 자세한 정보가 필요하면 저희 웹사이트를 방문하십시오 [www.health.gov.on.ca](http://www.health.gov.on.ca).