

غذائی اشیاء کو حفاظت سے رکھیے

صاف کرنا، علیحدہ کرنا، پکانا، جمانا

درج ذیل چار اقدامات پر عمل کر کے غذائی آلودگی کے خدشات، کم کیجیے:

صاف کرنا، علیحدہ کرنا، پکانا، جمانا

1 قدم: صاف کرنا

اپنے ہاتھ، تمام سطحیں اور برتن و آلات صاف کیجیے۔ اس عمل کو اکثر اور بہت اچھی طرح کیجیے! جراثیم ہاتھوں، کٹنگ بورڈز، چھریوں، صفائی کے کپڑوں، کاؤنٹر ٹاپس (اوپری سطحوں) اور از خود غذا پر داخل ہوسکتے ہیں۔

ہاتھ دھونے کی ٹپس

1. ہتھے ہوئے نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھ گیلے کیجیے۔
2. 15 سے 20 سیکنڈز تک صابن کے ساتھ ہاتھ ملیئے۔
3. ہاتھ اچھی طرح پانی سے دھوئیے اور پیپر ٹاول سے خشک کیجیے۔
4. نلکا بند کرنے کیلئے پیپر ٹاول استعمال کیجیے۔

آپ کو اپنے ہاتھ کب دھونا چاہیے؟

کھانا تیار کرنے، سنبھالنے، پیش کرنے یا تناول کرنے سے قبل اپنے ہاتھ دھوئیے۔

اپنے ہاتھ ضرور دھوئیے:

- واش روم (غسل خانہ) استعمال کرنے کے بعد
- چھینکنے، کھانسنے یا ناک سنکنے کے بعد
- اپنا چہرہ، منہ یا بال چھونے کے بعد
- کچا گوشت یا خام حالت میں دیگر غذائی اشیاء، یا مسطح مقام جن پر اشیاء رکھی گئی ہوں (مثلاً کٹنگ بورڈز، کاؤنٹر ٹاپس) کو ہاتھ لگانے کے بعد
- میلے یا استعمال شدہ برتن یا ڈشز سنبھالنے کے بعد
- نقدی (کرنسی) ہاتھ میں لینے کے بعد
- تمباکو نوشی کرنے کے بعد
- پالتو جانور چھونے کے بعد
- صفائی کرنے کے بعد
- کچرا اٹھانے کے بعد
- جب آپ بیمار ہوں تو غذا یا فوڈ کو ہاتھ نہ لگائیں، خصوصاً جب آپ کو قے یا اسہال ہو چکے ہوں۔

کھانے/غذائی اشیاء کیسے حفاظت سے رکھیں

ہر سال اونٹاریو میں ہزاروں لوگ غذائی آلودگی کے امراض (جنہیں فوڈ پوائزنگ/غذائی زہر آلودگی بھی کہتے ہیں) جھیلتے ہیں۔

اکثر و بیشتر غذائی آلودگی کے امراض بیکٹیریا کے باعث ہوتے ہیں۔ لیکن دیگر وائرسز، پیراسائٹس، ٹاکسنس (یا زہر خیزی) جو بعض بیکٹیریا یا کیمیلز سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر آپ کی غذا میں داخل ہوسکتے ہیں، وہ بھی ان امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگرچہ روایاتی طور پر بعض امراض کو غذائی آلودگی نہیں خیال کیا جاتا، لیکن بعض لوگوں کو مخصوص غذائی اجزاء (مثلاً مونگ پھلی) سے، خفیف تا شدید الرجیز یا ناموافق ہوسکتے ہیں۔

آپ ان بیکٹیریا یا دیگر جراثیم کو، سونگ یا ذائقہ سے آگاہ نہیں ہوسکتے، جن کے باعث غذائی آلودگی کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ موزوں درجہ حرارت پر یہ جراثیم چند مختصر گھنٹوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔

غذائی آلودگی کے امراض کی علامات میں درج ذیل شامل ہیں:

• ایکائی/متلی

• قے / الٹی

• اسہال/دست

• بخار

• معدے میں مروڑ

ہمیشہ یہ کہنا آسان نہیں ہوتا کہ علامات آپ کی غذا یا خوراک کی وجہ سے ہوئی یا نہیں۔ غذا کھانے کے بعد چند گھنٹوں سے لیکر کئی ہفتوں کے دوران کہیں بھی آپ بیماری کی کیفیات محسوس کرنا شروع کرسکتے ہیں۔ اکثر اوقات، لوگ آلودہ غذا کھانے کے بعد چند دنوں میں بیمار ہوجاتے ہیں۔

بعض اوقات طویل-مدتی پیچیدگیاں، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہوسکتی ہیں۔

وہ لوگ جنہیں شدید بیماری ہونے کا قرین امکان ہے، ان میں:

• عمر رسیدہ افراد

• چھوٹے بچے

• حاملہ خواتین

• لوگ جو پہلے ہی بیمار ہوں

اگر آپ کو شبہ ہو کہ غذائی آلودگی سے آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملیئے اور اپنے لوکل پبلک ہیلتھ یونٹ (مقامی ادارہ صحت) کو مطلع کیجیے۔

ایکوئپمنٹ (آلات) صاف کرنے کے ٹپس:

کچن کے ایکوئپمنٹ اور ڈشیز (آلات اور برتن) گرم پانی اور ڈش ڈیٹرجنٹ سے دھوئیے، پانی سے کھنگالیے اور پھر سینیٹائزر (صاف ستھرا) کیجیے۔

ڈشز (برتن) اور کٹنگ بورڈز (کٹائی کے تختوں) کو سینیٹائزر درج ذیل طریقے سے کیجیے:

- سنک (واش بیسن) میں، ہر بار بحساب فی لیٹر (4 کپ/پیالی) گرم پانی میں 2.5 ملی لیٹر (1/2 چائے کا چمچ) گھریلو استعمال کا بلیچ شامل کیجیے۔ ڈشیز اور کٹنگ بورڈز تقریباً 45 سیکنڈز کیلئے اس میں بھگو دیں۔ اس کے بعد، استعمال کرنے سے پہلے انہیں ہوا میں مکمل طور پر خشک ہونے دیجیے۔

کچن کے کاؤنٹرز، ٹیبلز (میزیوں)، نلکے، سنکس اور آلاجات (بشمول فرج کے ڈور ہینڈلز) کی صفائی ستھرائی کیلئے ان اقدامات پر عمل کیجیے:

- بحساب فی لیٹر (4 کپ/پیالی) گرم پانی میں 5 ملی لیٹر (1 چائے کا چمچ) گھریلو استعمال کا بلیچ ملائیے۔ اس مکسچر (امیزے) کو ایک لیبل شدہ اسپرے بوتل میں ڈالیں۔ کاؤنٹر ٹاپس اور دیگر تمام اوپری مسطح جگہوں پر مکسچر اسپرے کیجیے۔ پھر کسی صاف کپڑے یا پیپر ٹاول سے پونچھ لیجیے۔ اکثر مرتبہ تازہ محلول بنا کر استعمال کیجیے۔
- ڈش کلاتھس، ایپرن اور تولیوں کو صاف کرنے کیلئے، انہیں اکثر واشنگ مشین میں اچھی طرح دھوئیے۔

2 قدم: علیحدہ کرنا

اپنی غذائی اشیاء آلودہ نہ کیجیے! کراس-کنٹامینیشن (دو-آلودگی) اس وقت واقع ہوتی ہے جب بیکٹیریا کسی ایک غذائی شے سے دوسری غذائی شے میں پھیلنے لگتا ہے۔ یہ باسانی اس وقت ہوتا ہے جب پکائی ہوئی یا کھانے کی تیار غذا سے کچا گوشت یا دیگر غیر پکائی ہوئی اشیاء، گندے ہاتھ یا آلودہ برتن سے مس/ٹچ ہو جائیں۔ **خام اور کھانے کی تیار غذائی اشیاء علیحدہ علیحدہ رکھنیے!**

کراس-کنٹامینیشن (دو-بری-آلودگی) کے عمومی اسباب یہ ہیں:

- کٹنگ بورڈز، کاؤنٹر ٹاپس، پلیٹس اور غذائی استعمال کی دیگر مسطح اشیاء۔

- سلائسز، مکسرز اور گرائنڈرز

- کھانے کے برتن، چھریاں اور چمٹے (ٹانگرز)

- ہاتھ

- حشرات

- فوڈ پروب تھرمامیٹر ز (انہیں غذا/کھانے کا اندرونی درجہ حرارت جانچنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے)

- پکی ہوئی یا کھانے کی تیار غذا پر خام گوشت سے ٹپکنے والی رطوبات (رس/جوسز)

علیحدہ رکھنے کے ٹپس:

- خام گوشت، پولٹری اور سی فوڈ (سمندری غذا) کو فرج کے باٹم شیلف (نچلے خانے) میں اسٹور (ذخیرہ) کیجیے۔
- علیحدہ کٹنگ بورڈز استعمال کیجیے (مثلاً، ایک ہمیشہ خام گوشت کیلئے، اور ایک مختلف بورڈ پھل اور سبزیوں کیلئے)۔

- دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے، کٹنگ بورڈز، برتن اور فوڈ پروب تھرمامیٹر دھوئیں، کھنگالیں اور خشک و صاف کریں۔

- پکایا ہوا کھانا (فوڈ) کسی ایسی پلیٹ، کٹنگ بورڈ یا سطح پر برگز نہ رکھیں جس پر کچا گوشت، پولٹری، سی فوڈ یا انڈے استعمال ہوئے ہوں۔

- غذائی اشیاء کو مصلحہ لگا کر ریفریجریٹرز میں میرینیٹ (رچائیگی) کیجیے اور گلانے کیلئے اسی مصلحہ کو برگز استعمال نہیں کیجیے۔

- کھانا پکانے کے دوران تمباکو نوشی مت کیجیے۔

3 قدم: پکانا

کھانا کافی اونچے درجہ حرارت پر پکانیے اور اسے ڈینجر زون (خطرے کی حدود) سے باہر رکھنیے! ڈینجر زون وہ درجہ حرارت ہوتا ہے، جس میں بیکٹریا بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہ 4°C اور 60°C کے درمیان کا درجہ حرارت ہے۔

- گوشت، پولٹری، فیش/مچلی یا انڈے مناسب طور سے پکانے کیلئے، انہیں کافی اونچے درجہ حرارت پر کافی دیر تک گرم کیجیے (دیکھنیے جدول برائے درجہ حرارت یا ٹمپریچر چارٹ) تاکہ اسے مضر بیکٹریا کی تعداد بڑھنے سے بچا سکیں۔

- پکانے کے بعد، گرم غذا کو 60°C (140°F) درجہ حرارت یا زائد گرم رکھنیے حتیٰ کہ اسے کھانے کیلئے پیش کر دیا جائے۔

- جب تک کھانا گرم ہو، اسے گرم ہی پیش کیجیے یا جب ایک مرتبہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو جتنا جلد ممکن ہوسکے (تیار ہونے کے دو گھنٹوں کے اندر) اسے فریج یا فریزر میں رکھ دیجیے۔

پکانے کے ٹپس

- یقینی اطمینان کر لیجیے کہ غذائی اشیاء اور پانی ایک محفوظ اور قابل اطمینان ذرائع سے آئے۔

- پکائے ہوئے کھانے (مثلاً گوشت، پولٹری، مچھلی) کا اندرونی درجہ حرارت ماپنے کیلئے کوئی فوڈ پروب تھرمامیٹر استعمال کیجیے، کہ آیا یہ کافی اونچے درجہ حرارت پر پک چکے ہیں۔

- ادھ پکے ہوئے ہیم برگرز نہیں کھائیے۔ ہیم برگرز اور دیگر باریک گوشت کو متعلقہ درست اندرونی درجہ حرارت پر پکائیے۔

- مچھلی کو متناسب اندرونی درجہ حرارت پر پکائیے، جب تک، فورک (کانٹھے) کے ذریعہ اس کے فلیکس یا ٹکڑے باسانی بکھرنے لگیں۔

- متوازن پکائی کیلئے غذا/کھانے کو پہلے ڈھانپ کر، پھر ہلا کر اور پلٹ کر، مائیکرو ویو اوون کو درست طریقے سے استعمال کیجیے۔ اس طرح غذا کے کچا رہ جانے سے بچنے کیلئے مدد ملے گی۔

- ہر بار سارسز، سوپ اور گریوی کو مکمل ابال جانے تک گرم کیجیے۔ باقی بچی ہوئی دیگر اشیاء کو بھی 74°C (165°F) درجہ حرارت تک اچھی طرح گرم کیجیے۔

4 قدم: جمانا (بخ بستہ کرنا)

ڈی فراسٹنگ ٹپس:

آپ کی غذائی اشیاء (فوڈ) کو محفوظ اور مؤثر طور پر پگھلانے (ڈی فراسٹ) کے چند طریقے یہ ہیں:

- غذا کو فرج میں ڈی فراسٹ کیجیے۔ غذائی اشیاء کو کسی برتن میں ڈال کر فرج کے نچلے حصہ میں فی کلو 10 گھنٹے وقت کے حساب سے پگھلانے کیلئے رکھیے۔
- بہتے ہوئے سرد پانی کے نیچے رکھ کر فوڈ ڈی-فراسٹ کیجیے۔
- مائیکرو ویو میں فوڈ کو ڈی-فراسٹ کیجیے۔ پگھلانے کے فوراً بعد اسے پکا لیجیے۔

کچن کاؤنٹر (کسی مسطح جگہ) پر غذائی اشیاء برکز ڈی۔

فراسٹ نہیں کیجیے۔ سب سے پہلے غذائی اشیاء کی بیرونی سطحیں ڈی-فراسٹ ہونگی، اس سے قبل کہ یہ اندر سے پگھلے۔ ایسی صورتوں میں بیکٹیریا پیدا ہوسکتا ہے۔

غذائی اشیاء کی نقل و حمل اور ذخیرہ اندوزی (اسٹوریج)

- کھانے کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھیں، ماسوائے یہ کہ اسے تیار یا پیش کیا جا رہا ہو۔
- ٹرانسپورٹ (نقل و حمل) یا اسٹوریج (ذخیرہ کاری) کیلئے، غذائی اشیاء کو صاف فوڈ کنٹینرز، یا یکبار-استعمال کے فوڈ بیگز، ریس یا فونل سے لپیٹ کر، مضبوطی سے ڈھانپ کر رکھیے۔
- اگر آپ گرم کھانا ایک سے دوسرے مقام پر لے جا رہے ہوں، تو مناسب طور سے ڈھنپی ہوئی یا فونل اور موئے کپڑے سے لپیٹی ہوئی غذائی اشیاء کو کسی انسولیٹڈ تھرمل کنٹینر میں ڈالیں۔ ایک تھرمامیٹر بھی ساتھ رکھیے تاکہ چیک کیا جاسکے آیا کہ کھانا 60°C (140°F) یا اس سے زائد درجہ حرارت پر گرم ہے یا نہیں۔
- اگر آپ سرد غذائی اشیاء یا ٹھنڈی اشیاء ایک سے دوسرے مقام پر لے جا رہے ہوں، تو ڈھانپی ہوئی غذا کو ایک برف یا فروزن جیل پیکس والے کولر میں ڈالیں۔ ایک تھرمامیٹر ساتھ رکھیے تاکہ یہ چیک کیا جاسکے آیا کہ کھانا 4°C (40°F) درجہ یا اس سے زیادہ سرد ہے یا نہیں۔

بخ بستہ غذائی اشیاء جما کر ہی رکھیے! اس طرح غذائی آلودگی کے امراض پھیلنے کے خطرے کم ہوجائیں گے کیونکہ سرد درجہ حرارت بیکٹیریا کی شرح نمو بہت سست کر دیتی ہے۔

فوڈ (غذا) کو خطرے کے دائرہ سے باہر رکھیے۔

- ریفریجریٹر میں غذا (فوڈ) کو 4°C (40°F) یا مزید سرد درجہ پر رکھیے۔
- فریزر میں غذا (فوڈ) کو 18°C (0°F) یا مزید سرد درجہ انجماد پر رکھیے۔

ریفریجریٹر ٹپس:

- گوشت، پولٹری، فش، انڈے اور ڈیری پروڈکٹس (دودھ کی مصنوعات) خرید کر لانے یا پکانے کے بعد دو گھنٹوں کے دوران ریفریجریٹر میں رکھ دیجیے۔
- انڈے فریج کے دروازے میں رکھنے کے بجائے، ریفریجریٹر کے مرکزی حصہ میں رکھیے۔
- ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے، گرم کھانا چھوٹے اور ہلکے برتنوں میں منتقل کیجیے۔ اس طرح فرج میں کھانا جلد ٹھنڈا کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- فرج کو گنجائش سے زیادہ نہیں بھریے۔ غذائی اشیاء (فوڈ) کو محفوظ رکھنے کیلئے سرد ہوا کا گھومنا لازماً ممکن ہونا چاہیے۔
- ریفریجریٹر ز اور کولرز میں تھرمامیٹر استعمال کیجیے تاکہ اشیاء مناسب طور پر کافی ٹھنڈک جانچی جاسکے۔

محفوظ کوکنگ (پکائی) کیلئے باضابطہ درجہ حرارت

اس وقت تک پکائیے جب تک غذائی اشیاء (فوڈ) کا اندرونی درجہ حرارت، نیچے دیئے گئے درجہ حرارت تک نہ پہنچ جائے اور اس کے بعد بھی کم از کم مزید 15 سیکنڈز تک پکائی جاری رکھیے۔

| | |
|--------------|---|
| (82°C) 180°F | خام پولٹری: (مثلاً، چکن، ٹرکی، بطخ) |
| (74°C) 165°F | اسٹفنگ (بھری ہوئی) پولٹری |
| (74°C) 165°F | کٹی ہوئی یا قیمہ پولٹری • کٹی ہوئی پولٹری (مثلاً، سینہ، ران، ونگز) • پسی ہوئی یا قیمہ پولٹری |
| (74°C) 165°F | فوڈ مکسچرز (ملائے ہوئے کھانے) • فوڈ مکسچرز (مثلاً، سوپ، اسٹیو، کیسرولز، اسٹاکس، گریوی) جس میں پولٹری، انڈے، گوشت یا مچھلی شامل ہو۔ |

| | |
|--------------|--|
| (71°C) 160°F | <p>گوشت گائے، بھیڑ، برن یا بکری کا (روست اور اسٹیکس – درمیانی تکمیل)</p> <ul style="list-style-type: none"> • پورک یا فریش کیورڈ ہیم • پولٹری کے علاوہ کوئی قیمہ (مثلاً، بیف، پورک) |
| (70°C) 158°F | فیش/مچھلی |

مندرجہ ذیل اداروں کی قابل قدر معاونت سے یہ اشاعت پایہ تکمیل ہوئی

فارمرز مارکیٹس اونٹاریو

کینیڈین پارٹنرشپ فار کنزیومر فوڈ سیفٹی ایجوکیشن

ایسوسی ایشن آف سوپر وائزرز آف پبلک ہیلتھ انسپیکٹرز آف اونٹاریو

ایسوسی ایشن آف لوکل پبلک ہیلتھ ایجنسیز

ریسرچ یونیورسٹی، اسکول آف اوکوپیشنل اینڈ پبلک ہیلتھ

اینوائرمینٹل ہیلتھ فاؤنڈیشن آف کینیڈا

میمبرز آف دا فوڈ سیفٹی ایجوکیشن کمیونٹی روپ گروپ:

- کینیڈین انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ انسپیکٹرز (اونٹاریو برانچ)

- سٹی آف ہیملٹن، پبلک ہیلتھ سروسز

- کمیونٹی فوڈ ایڈوانزرز پروگرام، نیوٹریشن ریسورس سینٹر، اونٹاریو پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن

- ڈرہیم ریجن ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ

- فیڈرل اینڈ وومینس انسٹیٹیوٹس آف اونٹاریو (ROSE پروگرام)

- ہیلی برٹن، کوارتھا، پائن ریج ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ

- لیڈز، گرین ویلی اینڈ لینارک ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ

- اونٹاریو منسٹری آف ایگریکلچر، فوڈ این رورل افیئرز

- اونٹاریو منسٹری آف ہیلتھ پرموشن

- اوکسفورڈ کاؤنٹی پبلک ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروسز

- ریجنل آف پیل - پبلک ہیلتھ

- تھنڈر بے ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ

- ٹورونٹو پبلک ہیلتھ

- یارک ریجن ہیلتھ سروسز ڈیپارٹمنٹ

پبلک ہیلتھ یونٹ کنسلٹیشن سائٹس:

- سٹی آف ہیملٹن، پبلک ہیلتھ سروسز

- ڈرہیم ریجن ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ

- ہورون کاؤنٹی ہیلتھ یونٹ

- لیڈز، گرین ویلی اینڈ لینارک ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ

- نائیگرا ریجن پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ

- اوٹاوا پبلک ہیلتھ

- پیٹر باروہ کاؤنٹی-سٹی ہیلتھ یونٹ

- سڈبری اینڈ ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ

گورنمنٹ آف اونٹاریو انفارمیشن

www.health.gov.on.ca

انفو لائن: 1-866-801-7242

TTY 1-800-387-5559

ٹیلی ہیلتھ اونٹاریو

1-866-797-0000

TTY 1-866-797-0007

ٹیلی ہیلتھ اونٹاریو، ایک 24/7 متواتر سروس ہے جو کہ

نرس پریکٹیشنرز کے ذریعے آپ کو آپکی صحتی مسائل کے متعلق فوری جواب دیتا ہے۔