

人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗接种计划

针对 8 年级女孩：

您需要了解以下信息

什么是人乳头瘤病毒 (HPV) ?

HPV 是一种常见的病毒，主要有 100 余种类型。有些类型的 HPV 可导致女性宫颈癌。大多数 HPV 感染可通过接种疫苗进行预防。

HPV 如何传播?

HPV

通常是通过与感染者进行皮肤接触在性活动过程中进行传播的。

HPV 有哪些症状?

大多数人从未出现过此类症状，可能并不知道自己已经感染了

HPV，因而仍然携带着病毒，为此可能感染他人。根据 HPV 感染的类型，感染者可能引发宫颈异常、宫颈癌、其他生殖道癌肿或生殖道尖锐湿疣等症状。

患上 HPV 后可能出现哪些情况?

加拿大大多数成年人在其人生的某个时点均会感染 HPV。人体的免疫系统通常会自动驱除这些病毒。而对于某些人来说，这些病毒则可能导致宫颈癌。在安大略省，每年有 500 名女性被诊断出患有宫颈癌，其中有 140 名因此致死。

如何保护孩子免受 HPV 感染?

最好的办法就是为您的孩子接种疫苗。该疫苗可预防感染四种类型的 HPV 病毒，即类型 6、11、16 和 18。在加拿大，菌株 16 和 18 导致 70% 的宫颈癌。菌株 6 和 11 导致大约 90% 的生殖道尖锐湿疣

如何接种 HPV 疫苗?

疫苗接种主要使用针在手臂注射进行。

鉴于防护目的，需在学年中注射三次 HPV 疫苗。通常，第一次注射后，应于 2 个月后进行第二次注射，6 个月后进行第三次注射。

哪些人群应接种 HPV 疫苗?

经过批准，可对年龄为 9 到 26 岁的女性接种 HPV 疫苗。在性活动之前接种最为有效。省级政府提供资金通过学校医务室免费为 8 年级的所有女孩接种 HPV 疫苗。

哪些人群不能接种 HPV 疫苗?

如果您的孩子符合以下情况，则不能接种 HPV 疫苗：

- 已完全接种 HPV 疫苗；
- 上一次 HPV 疫苗注射后出现严重反应；
- 对酵母或疫苗某成分过敏；以及
- 怀有身孕。

如果您的孩子发烧或患有比轻微感冒严重的病，则不推荐其接受疫苗接种。

疫苗有无副作用?

HPV 疫苗极为安全，且在加拿大已通过批准，可对年龄为 9 到 26 岁的女性放心使用。HPV 疫苗和大多数其他有效疫苗有着类似的副作用。这些副作用包括注射部位发红、触痛和肿胀以及，较为少见还有：发烧、恶心、头晕及头痛。在疫苗接种 15 日以内如若出现任何异常反应，应向您的医生或当地卫生组织反映。这些异常反应包括呼吸困难、面部或嘴唇肿胀、39°C 以上高烧、荨麻疹或皮疹。公共卫生护士应进行疫苗接种并随时在学校医务室内提供服务。公共卫生护士均受过相关培训，可处理严重反应。



Ontario

疫苗的好处何在？

该疫苗对其防护的四种 HPV 类型几乎是 100% 有效。研究已表明，疫苗在接种后的五年内起到了良好的防护作用。接种疫苗后没有任何感染 HPV 病毒的风险，原因在于该疫苗不含活性病毒。

您还应了解有关 HPV 疫苗的其他重要事项，具体如下：

虽然该种疫苗提供了对 HPV 的一种高度防护，但仍不能取代宫颈癌筛查。定期的宫颈癌筛查，结合接种疫苗，对宫颈癌起到了最佳的防护作用。在今后的生活中可能需要进行加强接种。目前，尚未许可对男性接种该种疫苗

如果我的孩子不是 8 年级学生，她是否可以接种该疫苗？

安大略省政府特提供资金通过学校医务室免费为 8 年级所有女孩接种 HPV 疫苗。所有其他年龄为 9 到 26 岁的女性均可就诊并支付相关费用进行疫苗接种。三次注射总费用大约为 400 美元。

在进行 HPV 疫苗接种之前，公共卫生护士将会询问孩子以下问题：

- 孩子当日的健康状况；
- 孩子的总体健康状况；
- 有无疫苗或药物过敏症；
- 有无正在服用任何药物；
- 关于过去有无接种疫苗的任何问题；以及
- 以前有无接种 HPV 疫苗。

在孩子接种疫苗的当天：

- 让您的孩子穿一件短袖衬衫以方便进行疫苗接种；以及
- 去诊所前，让您的孩子吃一顿营养丰富的早餐或午餐。

如果您的孩子已接种过 HPV 疫苗，请致电当地的公共卫生组织以更新您孩子的记录或在同意表中填写相关信息。

如想了解更多：

有关详情，请

- 致电资讯专线 (INFOline)
：1-866-559-4598 (TTY 1-800-387-5559)
- 登录 www.hpvontario.ca
- 与当地公共卫生组织联系