

Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás nyolcadikos lányoknak Tudnivalók

Mi az a humán papillomavírus (HPV)?

A HPV gyakori vírus és 100-nál több típusa van. A HPV egyes típusai nőknél méhnyakrákot okozhatnak. A HPV-fertőzések legnagyobb része védőoltással megelőzhető.

Hogyan terjed a HPV?

A HPV leggyakrabban bőrről bőrre terjed, a fertőzött személlyel való szexuális érintkezéskor.

Mik a HPV tünetei?

A legtöbb embernél soha nem jelentkeznek tünetek, talán nem is sejtik, hogy a HPV megfertőzte őket, mégis hordozzák a vírust, és másokat is megfertőzhetnek. A HPV-fertőzés típusától függően a fertőzött személynél méhnyaki rendellenességek, méhnyakrák, egyéb nemi szervi rák vagy nemi szervi herpesz alakulhat ki.

Mi történhet, ha valaki elkapja a HPV-t?

Kanadában a legtöbb felnőttet életében egyszer megfertőzi a HPV. A test immunrendszere általában egyedül is legyűri a vírust. Egyes embereknél a vírus méhnyakrákot okozhat. Ontarióban évente 500 nőnél állapítanak meg méhnyakrákot, és 140-en halnak meg.

Hogyan segíthetek megóvni gyermekem a HPV-től?

Vigye védőoltásra a gyermeket. A védőoltás védelmet nyújthat a fertőzéssel szemben a vírus négy típusánál, a 6-os, a 11-es, a 16-os és a 18-as típusnál. Kanadában a 16-os és a 18-as típus okozza a méhnyak rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek 70%-át. A 6-os és a 11-es típus okozza a nemi szervi herpeszek kb. 90%-át.

Hogyan adják a HPV elleni védőoltást?

A védőoltást injekciós tűvel karba adják. A védettséghez a HPV elleni védőoltás három dózisára van szükség. Mindhárom dózist egy tanítási éven belül adják. A második dózist általában 2 hónappal az első dózis után, a harmadik dózist pedig 6 hónappal az első dózis után.

Ki kapjon HPV elleni védőoltást?

A HPV elleni védőoltást 9 és 26 év közötti nők számára hagyták jóvá. Akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt kapják. A HPV elleni védőoltást a tartományi kormány térítésmentesen biztosítja minden nyolcadikos lány számára az iskolai rendeléseken.

Ki ne kapjon HPV elleni védőoltást?

Gyermeke ne kapjon HPV elleni védőoltást, ha

- megkapta már a teljes HPV elleni védőoltást;
- súlyos tüneteket mutatott a HPV elleni védőoltás egyik előző dózisa után;
- élesztőgombára vagy a védőoltás egyik összetevőjére allergiás; vagy
- terhes.

Nem ajánljuk, hogy gyermeke védőoltást kapjon, ha lázas vagy bármilyen, kisebb megfázásnál súlyosabb betegsége van.

Vannak mellékhatásai a védőoltásnak?

A HPV elleni védőoltás biztonságos, és alkalmazását Kanadában jóváhagyták a 9 és 26 év közötti nők számára. A HPV elleni védőoltás mellékhatásai hasonlóak a rendelkezésre álló védőoltások többségének mellékhatásaihoz. Ezek közé tartozik a bőr kipirosodása, felpuhulása vagy megdagadása a szúrás helye körül, ritkább esetben láz, hányinger, szédülés vagy fejfájás. A védőoltás utáni 15 napon belül néha jelentkező tüneteket jelenteni kell az orvosnak vagy a helyi egészségügyi részlegnek. Ezek közé a tünetek közé tartozik a légzészavar, az arc vagy az ajkak megdagadása, a 39 foknál magasabb láz és a bőrkiütések. A védőoltást közegészségügyi nővérek adják, akik az iskolai rendelések idején állandóan jelen vannak. Tudják, hogyan kell kezelni a súlyos tüneteket.

Mennyire jó a védőoltás?

A védőoltás közel 100%-os hatékonyságú a HPV azon négy típusa ellen, amelyek ellen védelmet nyújt. A tanulmányok szerint kellő védeltséget biztosít a védőoltás utáni öt évre. Mivel az oltóanyagban nincs élő vírus, nincs olyan veszély, hogy valaki a védőoltástól HPV-fertőzést kap.

Egyéb fontos tudnivalók a HPV elleni védőoltással kapcsolatban:

Bár a védőoltás nagyfokú védeltséget biztosít a HPV-vel szemben, a méhnyakrák-szűrést nem pótolja.

A méhnyakrák elleni legjobb védelmet a rendszeres méhnyakrák-szűrés és a védőoltás együttesen biztosítja. Az élet folyamán később megerősítő védőoltásra lehet szükség. A védőoltást férfiak számára jelenleg nem engedélyezik.

Megkaphatja-e a védőoltást az a gyermekem is, aki nem nyolcadikos?

A HPV elleni védőoltást Ontario kormánya térítésmentesen biztosítja minden nyolcadikos lány számára az iskolai rendeléseken. A többi 9 és 26 év közötti nő orvosához fordulhat, hogy térítés ellenében megkapja a védőoltást. A három dózis összesen kb. 400 dollárba kerül.

A HPV elleni védőoltás beadása előtt a közegészségügyi nővér néhány kérdést tesz fel gyermekének a következőkről:

- gyermeke egészségi állapota az adott napon;
- gyermeke általános egészségi állapota;
- esetleges allergia védőoltásra vagy gyógyszerekre;
- szed-e gyógyszert a gyermek;
- voltak-e problémák korábbi védőoltásoknál; és
- kapott-e korábban HPV elleni védőoltást.

Azon a napon, amelyen a gyermek a védőoltást kapja:

- viseljen rövidujjas inget, hogy a védőoltás beadása könnyebb legyen; és
- a rendelés előtt jól reggelizzen vagy ebédeljen meg.

Ha gyermeke már megkapta a HPV elleni védőoltást, kérjük hívja fel a helyi közegészségügyi részleget, hogy egyeztessék a gyermek nyilvántartásait és feltüntessék ezt a tájékoztatást a beleegyezési nyilatkozaton.

Többet szeretne tudni?

További tájékoztatásért:

- hívja az INFOLINE-t: 1-866-559-4598 (halláskárosultak: 1-800-387-5559);
- látogasson el weboldalunkra: www.hpvontario.ca; vagy
- vegye fel a kapcsolatot a helyi közegészségügyi részleggel.