

Ministère de la Santé

COVID-19 – Document de référence sur les symptômes

Version 6.0 – 6 août 2020

Le présent document décrit les symptômes les plus couramment associés à la COVID-19. Ces renseignements sont à jour en date du 6 août 2020 et peuvent faire l'objet d'une mise à jour à mesure que la situation entourant la COVID-19 continue d'évoluer. En cas de divergence entre la présente liste et un autre document d'orientation, la présente liste devrait être considérée comme étant la plus à jour.

Les symptômes courants de la COVID-19 comprennent :

- Une fièvre (température de 37,8°C ou plus)
- Une toux nouvelle ou aggravée
- Un essoufflement (dyspnée)

Les autres symptômes de la COVID-19 peuvent comprendre :

- Un mal de gorge
- Une difficulté à avaler
- Un nouveau trouble olfactif ou gustatif
- Une nausée ou des vomissements, une diarrhée, une douleur abdominale
- Un écoulement nasal ou une congestion nasale – *en l'absence de raison sous-jacente à ces symptômes, comme les allergies saisonnières, l'écoulement post-nasal, etc.*

Les autres signes cliniques de la COVID-19 peuvent comprendre :

- Une preuve clinique ou radiologique d'une pneumonie

Les symptômes/images cliniques atypiques de la COVID-19 doivent être pris en compte, en particulier chez les enfants, les personnes plus âgées et les personnes qui ont une déficience intellectuelle.

Les symptômes atypiques peuvent comprendre :

- Une fatigue ou un malaise inexplicable ou une myalgie
- Un délire (altération aiguë de l'état mental et inattention)
- Des chutes inexplicables ou accrues
- Un déclin fonctionnel aigu
- Une exacerbation de problèmes de santé chroniques

- Des frissons
- Des maux de tête
- Une laryngotrachéite aiguë
- Une conjonctivite

Les signes atypiques peuvent comprendre :

- Une tachycardie inexplicée, y compris la tachycardie selon l'âge chez l'enfant
- Une diminution de la tension artérielle
- Une hypoxie inexplicée (même si elle est légère, c.-à-d. que la saturation en O₂ est inférieure à 90 %)
- Une léthargie, des difficultés d'alimentation chez les nourrissons (en l'absence de tout autre diagnostic)

Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants

L'information sur ce syndrome et son association temporelle avec la COVID-19 est encore en cours d'élaboration. Les renseignements sur les symptômes associés au syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants peuvent évoluer. Veuillez consulter la [définition de cas de l'Organisation mondiale de la santé \(OMS\)](#) ou du [Programme canadien de surveillance pédiatrique \(PCSP\)](#) pour les critères de diagnostic.

Les symptômes associés à ce syndrome peuvent comprendre :

- Une fièvre persistante
- Une conjonctivite
- Des symptômes gastro-intestinaux, tels que nausées ou vomissements, diarrhée et douleurs abdominales
- Une éruption cutanée