

Admissibilité au vaccin Prevnar® 13

Tableau 1 : Immunisation conjuguée antipneumococcique SYSTÉMATIQUE

Cohorte d'âges admissibles	État de santé	Doses de Prevnar® 13 recommandées	Calendrier de vaccination recommandé
À partir de 2 mois	Faible risque (enfants en santé ne présentant aucun problème médical augmentant les risques de contracter une pneumococcie invasive (PI))	3 doses	2, 4 et 12 mois
À partir de 2 mois	Risque élevé†	4 doses	2, 4, 6 et 15 mois

Tableau 2 : Immunisation conjuguée antipneumococcique de RATRAPAGE

Cohorte d'âges admissibles	État de santé	Doses de vaccination conjuguée antipneumococcique déjà reçues	Dose(s) de Prevnar® 13 recommandée(s)	Calendrier de vaccination recommandé
De 2 mois à 59 mois (< 5 ans)	<ul style="list-style-type: none"> Faible risque ou Risque élevé† 	<ul style="list-style-type: none"> N'a pas complété la série avec pneu-C-7 et/ou pneu-C-10 	1 à 3 doses selon l'âge à la première dose	Voir les tableaux 3 et 4 pour le calendrier de vaccination
De 12 mois à 59 mois (< 5 ans)	<ul style="list-style-type: none"> Risque élevé† 	<ul style="list-style-type: none"> A complété la série avec pneu-C-7 et/ou pneu-C-10 	1 dose de rattrapage	≥ 8 semaines après la dernière dose de vaccin conjugué antipneumococcique
<p>Admissible à partir de janvier 2011</p> <p>2 ans ou aura 2 ans en 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> Faible risque 	<ul style="list-style-type: none"> A complété la série avec pneu-C-7 et/ou pneu-C-10 	1 dose de rattrapage	≥ 8 semaines après la dernière dose de vaccin conjugué antipneumococcique

Calendriers de vaccination du Prevnar®13

Tableau 3 : Calendrier de vaccination du Prevnar®13 pour les enfants à FAIBLE RISQUE qui n'ont pas complété ou commencé leur série

Âge de l'enfant au moment de la visite	Nombre de doses reçues de la vaccination conjuguée antipneumococcique	Dose(s) recommandée(s) de Prevnar®13 requise(s) pour compléter la série
De 2 à 6 mois	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
	1 dose (1 ^{re} dose)	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
	2 doses adaptées à l'âge (1 ^{re} et 2 ^e doses)	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
De 7 à 11 mois	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
	1 dose (1 ^{re} dose)	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
	2 doses (1 ^{re} et 2 ^e doses)	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 12 mois
De 12 à 23 mois (< 2 ans)	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à < 12 mois	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à ≥ 12 mois	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à < 12 mois + 1 dose (2 ^e dose) à ≥ 12 mois	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose
	2 doses ou plus à < 12 mois	1 dose, ≥ 8 semaines après la dose la plus récente
De 24 à 59 mois (< 5 ans)	0 dose	1 dose, ≥ 8 semaines après la dose la plus récente (s'il y a lieu)
	Toute vaccination incomplète	

Pour une liste des pathologies qui augmentent les risques de contracter une PI, veuillez vous référer à la page 3.

Calendriers de vaccination du Prevnar®13

Tableau 4 : Calendrier de vaccination du Prevnar®13 pour les enfants à RISQUE ÉLEVÉ[†] qui n'ont pas complété ou n'ont pas commencé leur série

Âge de l'enfant au moment de la visite	Nombre de doses reçues de la vaccination conjuguée antipneumococcique	Dose(s) recommandée(s) de Prevnar®13 requise(s) pour compléter la série
De 2 à 6 mois	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 15 mois
	1 dose (1 ^{re} dose)	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 15 mois
	2 doses adaptées à l'âge (1 ^{re} et 2 ^e doses)	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose 4 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 3 ^e dose et à ≥ 15 mois
De 7 à 11 mois	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 15 mois
	1 dose (1 ^{re} dose)	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 15 mois
	2 doses (1 ^{re} et 2 ^e doses)	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose et à ≥ 15 mois
De 12 à 23 mois (< 2 ans)	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à < 12 mois	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose 3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à ≥ 12 mois	2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose
	1 dose (1 ^{re} dose) à < 12 mois + 1 dose (2 ^e dose) à ≥ 12 mois	3 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 2 ^e dose
	2 doses ou plus à < 12 mois	1 dose, ≥ 8 semaines après la dose la plus récente
De 24 à 59 mois (< 5 ans)	0 dose	1 ^{re} dose (maintenant) 2 ^e dose, ≥ 8 semaines après la 1 ^{re} dose
	Toute vaccination incomplète	1 dose, ≥ 8 semaines après la dose la plus récente

[†] Pathologies qui augmentent les risques de contracter une PI :

- Maladie respiratoire chronique (excluant l'asthme, sauf chez les personnes traitées avec des doses élevées de corticostéroïdes)
- Maladie cardiaque chronique
- Cirrhose
- Maladie rénale chronique ou syndrome néphrotique
- Diabète mellitus
- Asplénie, dysfonction splénique, drépanocytose et autres hémoglobinopathies drépanocytaires
- Fuite de liquide céphalorachidien chronique
- Déficience immunitaire primaire
- Infection au VIH et autres pathologies associées à l'immunosuppression (tumeurs malignes, utilisation de longue durée de corticostéroïdes systémiques et autres traitements immunosuppresseurs)
- Receveurs de transplantations d'organes pleins
- Receveurs d'implant cochléaire (pré/post greffe)

Attention : Les enfants de 24 à 59 mois à risque élevé de PI devraient également recevoir une dose de vaccin polysaccharidique antipneumococcique après avoir reçu le vaccin conjugué antipneumococcique. À ce sujet, veuillez consulter le *Calendrier de vaccination systématique financée par le secteur public* à www.health.gov.on.ca/english/providers/program/immun/pdf/schedulef.pdf.