

Ministerio de Salud

Después de recibir la vacuna contra la COVID-19

Versión 2.0 29 de marzo de 2021

¿Qué debo esperar en los próximos días?

- Los efectos secundarios más comunes son dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre moderada.
- Los efectos secundarios graves son poco frecuentes. Llame al médico o a la enfermera o acuda al servicio de urgencias más cercano si presenta alguna de las siguientes reacciones adversas en los tres días siguientes a la administración de la vacuna: urticaria, hinchazón de la cara o la boca, dificultad para respirar, color muy pálido y somnolencia excesiva, fiebre alta (más de 40°C), convulsiones o ataques, u otros síntomas graves (por ejemplo, "hormigueo" o entumecimiento).
- La vacuna AstraZeneca/COVISHIELD está asociada a un efecto secundario muy poco frecuente conocido como [trombocitopenia inmunitaria protrombótica inducida por la vacuna \(VIPIT\)](#). Si presenta alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna, solicite atención médica de inmediato: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón o frío en un brazo o una pierna, dolor abdominal persistente, dolor de cabeza intenso o que empeora o visión borrosa, o múltiples hematomas pequeños, manchas rojas o moradas o ampollas de sangre debajo de la piel.

¿Debo seguir cumpliendo con las medidas de salud pública a causa de COVID-19?

- La vacuna es un modo adicional de protección contra la COVID-19. Después de cualquiera de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 debe seguir cumpliendo con las medidas de protección, como usar una mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos.
- Controle a ver si tiene síntomas de COVID-19 y hágase la prueba si los presenta.

¿Cuándo debo volver para recibir la segunda dosis?

- Para que la inmunización sea completa se deben recibir dos dosis de la vacuna. Si ésta es su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, asegúrese de recibir la segunda dosis según las indicaciones de la clínica o del sistema de reservas. Traiga a su segunda cita el comprobante impreso de la vacuna que le han puesto hoy.