

# Demeurez à jour en matière de vaccins contre la COVID-19 : doses recommandées

Version 2.0 – 2 mai 2022 (modifié 24 mai 2022)

Ce document d'orientation ne contient que des renseignements de base. Ce document n'est pas destiné à fournir ou à remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement, ou des conseils juridiques. En cas de divergence entre le présent document de lignes directrices et toute loi, ordonnance ou directive applicable émise par le ministre de la Santé, le ministre des Soins de longue durée ou le médecin hygiéniste en chef, la loi, l'ordonnance ou la directive a préséance.

## Faites-vous vacciner et demeurez à jour

- Une personne **à jour** en ce qui a trait à la vaccination a reçu toutes ses doses recommandées contre la COVID-19, y compris la ou les doses de rappel lorsqu'elle y est admissible.

La protection après une série primaire de vaccins contre la COVID-19 diminue au fil du temps, en particulier contre le variant préoccupant Omicron. Les doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 aident à accroître la protection contre les infections symptomatiques et les complications graves et à réduire la transmission dans la population.

La définition de « personne à jour dans sa vaccination contre la COVID-19 » devra probablement être modifiée au fil du temps en fonction de la disponibilité future de nouveaux vaccins, de changements potentiels dans l'épidémiologie de la maladie et à mesure que de nouvelles données concernant les doses de rappel supplémentaires deviendront disponibles.

La définition d'« [entièrement vacciné\(e\)](#) » (qui fait habituellement référence à une série primaire complète) peut continuer à être utilisée dans certains contextes, et les politiques, lois, directives ou ordonnances pertinentes doivent continuer à être respectées le cas échéant.

## Comment savoir si vous êtes « à jour » en matière de vaccins contre la COVID-19?

Les personnes sont à jour dans leur vaccination contre la COVID-19 lorsqu'elles ont suivi les recommandations énumérées ci-dessous et dans le tableau 1. Les recommandations seront différentes selon l'âge de la personne, son état de santé et les vaccins qu'elle a reçus.

### Enfants de 5 à 11 ans

On recommande aux enfants de 5 à 11 ans de recevoir une série primaire de vaccins contre la COVID-19 pour être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.

Actuellement, des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas recommandées pour ce groupe d'âge.

### Personnes de 12 à 59 ans

On recommande aux personnes de 12 à 59 ans de recevoir une dose de rappel pour être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.<sup>1</sup>

La dose de rappel est recommandée  $\geq 6$  mois après la dernière dose de leur série primaire de vaccins contre la COVID-19 (pour les personnes de 12 à 17 ans), ou  $\geq 3$  mois après la dernière dose de leur série primaire de vaccins contre la COVID-19 (pour les personnes de 18 à 59 ans).

### Personnes de 60 ans et plus

On recommande aux personnes de 60 ans et plus de recevoir deux doses de rappel pour être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.

---

<sup>1</sup> Les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les membres non autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus peuvent également se voir offrir seconde dose de rappel. La nécessité ou non des programmes de doses de rappel du vaccin dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis doit être déterminée par les dirigeants de ces communautés et ces communautés elles-mêmes et avec l'appui de partenaires en santé publique conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La première dose de rappel est recommandée  $\geq 3$  mois après la dernière dose de leur série primaire de vaccins contre la COVID-19. La deuxième dose de rappel est recommandée  $\geq 5$  mois après la première dose de rappel.

### **Résidents de foyers de soins de longue durée, de maisons de retraite, de pavillons de soins pour aînées et adultes âgés vivant dans d'autres types d'habitations collectives**

Il est recommandé aux résidents des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite, des pavillons de soins pour aînées et des adultes âgés vivant dans d'autres types d'habitations collectives de recevoir deux doses de rappel afin d'être à jour dans leur vaccination contre la COVID-19.

La première dose de rappel est recommandée  $\geq 3$  mois après la dernière dose de leur série primaire de vaccins contre la COVID-19. La deuxième dose de rappel est recommandée  $\geq 3$  mois après la première dose de rappel.

### **Personnes modérément ou gravement immunodéprimées**

On recommande aux personnes de 5 ans et plus qui sont modérément ou gravement immunodéprimées de recevoir une série primaire de 3 doses de vaccins contre la COVID-19.

Après cette série primaire de 3 doses, les personnes qui sont modérément ou gravement immunodéprimées doivent suivre les recommandations indiquées ci-dessus concernant une première et deuxième dose (si admissibles) de rappel, en fonction de l'âge, afin d'être à jour avec leur vaccination contre la COVID-19.

### **Personnes ayant reçu des vaccins non autorisés par Santé Canada<sup>2</sup>**

Les personnes qui n'ont reçu qu'**une ou deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada** (SC) peuvent recevoir une dose supplémentaire en Ontario au moins 28 jours après la dose précédente pour compléter leur série primaire.

Les personnes qui ont reçu **un vaccin autorisé par SC et un autre non autorisé** (dans un ordre ou dans l'autre) n'ont pas besoin de dose supplémentaire pour compléter leur série primaire.

---

<sup>2</sup> Consultez le [site Web](#) de Santé Canada pour obtenir une liste des vaccins autorisés contre la COVID-19.

Les personnes qui ont reçu **trois doses** (toutes combinaisons de vaccins, autorisés ou non par SC) n'ont pas besoin de doses supplémentaires pour compléter leur série primaire.

À la suite de toute dose supplémentaire nécessaire pour compléter leur série primaire, ces personnes doivent suivre les recommandations indiquées à la page 2 concernant la dose de rappel en fonction de l'âge, afin d'être à jour avec leur vaccination contre la COVID-19.

### **Personnes qui ont eu la COVID-19**

Les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 doivent recevoir le nombre recommandé de doses indiqué ci-dessus. Toutefois, on leur recommande d'attendre de 4 à 8 semaines après avoir contracté la COVID-19 avant de recevoir la dose suivante de leur série primaire. On recommande aux personnes qui auraient contracté la COVID-19 après leur série primaire complète de vaccins d'attendre 3 mois avant de recevoir une dose de rappel. Le moment optimal peut être déterminé par un fournisseur de soins de santé et dépendra de l'âge, du nombre de doses reçues, du risque d'exposition et de l'état de santé.

**Tableau 1 : Série de vaccinations contre la COVID-19 pour les personnes de 5 ans et plus**

Âge	Intervalles recommandés	Intervalles minimums
5 à 11 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 8 semaines après la 1<sup>re</sup> dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 21 jours après la 1<sup>re</sup> dose</li> </ul>
12 à 17 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 8 semaines après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 6 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 21 jours après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 3 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> </ul>
18 à 59 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 8 semaines après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 3 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 21 jours (Pfizer-BioNTech) ou 28 jours (Moderna) après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 3 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> </ul>
60 ans et +	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 8 semaines après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 3 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose de rappel, 5 mois après la dose de rappel précédente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 21 jours (Pfizer-BioNTech) ou 28 jours (Moderna) après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 3 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose de rappel, 3 mois après la dose de rappel précédente</li> </ul>
Individus modérément ou gravement immunodéprimés de ≥5 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 8 semaines après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>3<sup>e</sup> dose, 2 mois après la 2<sup>e</sup> dose</li> <li>Dose de rappel, 6 mois (si entre 12 et 17 ans) ou 3 mois (si 18 ans+) après la 3<sup>e</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose de rappel (si 60 ans+ ou autre groupe admissible), 5 mois après la dose de rappel précédente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>re</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose, 21 jours (Pfizer-BioNTech) ou 28 jours (Moderna) après la 1<sup>re</sup> dose</li> <li>3<sup>e</sup> dose, 28 jours après la 2<sup>e</sup> dose</li> <li>Dose de rappel (si 12 ans+), 3 mois après la 3<sup>e</sup> dose</li> <li>2<sup>e</sup> dose de rappel (si 60 ans+ ou autre groupe admissible), 3 mois après la dose de rappel précédente</li> </ul>